

La tique s'agrippe à sa victime

La larve puis la nymphe de la tique sont deux fois plus petites que la tique du chien. À ces stades, la tique est redoutable en raison de sa taille microscopique. **La tique ne vole pas, ni ne saute; elle s'agrippe à sa victime** qui frôle la branche, la feuille ou le brin d'herbe où elle se tapit. Sur une période de deux ans, la tique se gave d'un repas de sang sur des animaux ou des humains à chaque étape de sa croissance jusqu'à maturité sexuelle. Le mâle adulte ne pique pas et meurt après l'accouplement. La tique femelle prend son dernier repas sur un hôte pendant 2 à 10 jours. Gorgée de sang, elle se laisse tomber au sol et pond de 2000 à 3000 œufs puis meurt. **L'hypothèse de transmission de spirochètes (plus rarement) par des moustiques, punaises, taons, voire sangsues ou aoûtats** parfois démontrée ou évoquée, mais cette hypothèse ne fait pas l'objet d'un consensus. Selon le **CDC** (agence gouvernementale **américaine**), aucune transmission de personne à personne (par toucher, baiser, ou acte sexuel) n'a été prouvée, bien que quelques borrélioses puissent être trouvées dans la plupart des fluides corporels des malades. **D'autres tiques que celles à pattes noires peuvent transmettre aussi d'autres maladies.**

La taille microscopique des larves ne manque d'impressionner.



Ci-dessous la TAILLE RÉELLE d'une tique à différents stades de sa croissance qui dure de 2 à 3 ans :

LARVES NYMPHE TIQUE



Les bactéries se camouflent

Les bactéries de la maladie de Lyme, les spirochètes, **se disséminent à une vitesse fulgurante** dans l'organisme par le système sanguin. Elles pénètrent les tissus dans un mouvement en vrille et elles se recouvrent de protéines se camouflant ainsi du système immunitaire et déjouant les tests sérologiques. Voir sur www.canlyme.org une vidéo sur les spirochètes (bactéries) en action.

La maladie de Lyme est très souvent mal diagnostiquée et facilement confondue avec beaucoup d'autres maladies :

Fibromyalgie, différents types d'arthrite, le syndrome de la fatigue chronique, des troubles cardiaques, le lupus, la sclérose en plaques, la psychose maniaco-dépressive et d'autres troubles psychiatriques, les premiers stades de la

SLA ou ceux de la maladie d'Alzheimer, le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn et bien d'autres.

Les premiers symptômes

La maladie de Lyme se manifeste **comme le ferait la grippe ou le rhume** avec de la fièvre, des douleurs musculaires, de la fatigue etc. En quelques semaines ou en quelques mois, rapidement sans bruit, la maladie peut évoluer jusqu'à une forme chronique et elle peut provoquer des symptômes qui peuvent varier, disparaître puis réapparaître (symptômes récurrents). Les symptômes de la **maladie de Lyme et les co-infections transmises par les tiques sont fort nombreuses** et varient d'un patient à l'autre. Les bactéries peuvent rester en dormance et les symptômes ne se manifester que des années plus tard. **Une victime peut être un porteur sain** pendant 5, 10, 15 ans ou plus.

LES SIGNES CLINIQUES LES PLUS COURANTS :

1. Frissons ou bouffées de chaleurs inexpliquées; sueurs nocturnes
2. Baisse de la température du corps
3. Gains ou pertes de poids inexpliqués
4. Pertes de cheveux inexpliquées
5. Inflammation des ganglions (aine, aisselles, cou)
6. Atteinte du système lymphatique (rétention d'eau)
7. Douleurs testiculaires ou pelviennes
8. Dérèglement inexpliqué du cycle menstruel
9. Seins douloureux ou production de lait inexpliquée
10. Troubles de la vessie et de la fonction urinaire (difficulté à commencer ou à arrêter la miction)
11. Dysfonctionnement sexuel ou perte de libido
12. Symptômes changeant qui partent et qui reviennent
13. Douleurs se déplaçant dans différentes parties du corps
14. Maux d'estomac (nausées ou douleurs); constipation, diarrhée
15. Douleurs dans la poitrine ou dans les côtes
16. Essoufflement, toux; mal de gorge
17. Palpitations, arythmie, insuffisance cardiaque; souffle cardiaque ou prolapsus valvulaire
18. Douleurs articulaires, musculaires ou crampes
19. Contractions involontaires des muscles du visage ou autres muscles
20. Douleurs, raideurs et craquements dans le cou; maux de tête légers ou sévères
Paralysie faciale périphérique (paralysie de Bell) et/ou engourdissement
21. Troubles de vision (double ou floue), perception de corps flottants, sensibilité à la lumière; perte de champ visuel, névrite optique
22. Troubles de l'ouïe : sensibilité aux bruits, perte d'audition, acouphènes

23. Mal des transports, vertige, problèmes d'équilibre, mal de mer
24. Faiblesses, étourdissements
25. Tremblements
26. Difficultés de concentration, difficultés à lire et à écrire
27. Oublis, déficiences de la mémoire à court terme
28. Désorientation; perte de repères
29. Difficultés d'élocution (mauvais articulation ou lenteur)
30. Sautes d'humeur, irritabilité, dépression
31. Troubles du sommeil : trop ou pas assez, réveils fréquents
32. Symptômes amplifiés à la consommation d'alcool, gueule de bois

Le traitement

Les **tests sanguins ELISA et Western Blot** qui peuvent être utilisés **sont maintenant décriés par SANTÉ CANADA comme plus ou moins fiables ou sensibles**. Il est fortement recommandé de n'utiliser les tests sérologiques qu'à seule fin de recoupement avec un diagnostic clinique (histoire de cas), tel que défini par le CDC (Center for Disease Control) des États-Unis.

Dans la phase primaire, selon le protocole de traitement ILADS, les antibiotiques pris durant les 6 premières semaines depuis la morsure pourront éliminer les bactéries de la maladie de Lyme de votre organisme. Cela seulement si le diagnostic est posé assez tôt.

Quand la maladie de Lyme est répandue dans le corps et dans sa phase chronique la période de traitement est plus longue. Cela selon l'évaluation de cas par votre médecin. On peut parfois compter quelques mois ou plus de traitement.

La maladie de Lyme est rarement mortelle si elle est diagnostiquée et soignée adéquatement à moins qu'il ne s'agisse d'une atteinte sévère au cœur ou d'un suicide.

Conseil : Vous devriez faire avec minutie un auto-examen de votre corps de la tête aux pieds après chaque sortie dans la nature. N'oubliez pas les enfants et les animaux domestiques. On retrouve les tiques surtout sur les parties chaudes et humides du corps. **Canlyme a des personnes ressources QUÉBÉCOISES s'étant fait piquer au Québec...**

Ces informations ne sont pas un avis médical

Consulter un médecin spécialiste de lyme
Faites un don pour nous aider à vous informer (reçus provincial et fédéral)